РЕАКЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ЦИС- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ ТА $\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2$ З 1-АМІНОПРОПІЛІДЕН-1,1-ДИФОСФОНОВОЮ КИСЛОТОЮ

О. М. Козачкова^{1*}, Н. В. Царик¹, В. І. Пехньо¹, В. В. Трачевський²

¹Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України, просп. Акад. Палладіна, 32/34, Київ 03142, Україна

²ТЦ НАН України, вул. Покровська, буд. 13, Київ 04070, Україна

*e-mail: complex@ionc.kiev.ua

Методами рН-потенціометрії, електронної- та ЯМР-спектроскопії досліджено комплексоутворення цис- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ та $\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2$ (en – етилендіамін) з 1-амінопропіліден-1,1-дифосфоною кислотою (APrDP, H_4L) у розчинах із зовнішньоклітинною концентрацією хлорид-іонів (0.15 моль/л) та співвідношенні $\text{Pd}(\text{II})\text{:APrDP}=1\text{:}1$, $1\text{:}2$ та $2\text{:}1$.

Встановлено, що при взаємодії в системі цис- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2\text{:APrDP}=1\text{:}1$ залежно від рН утворюються комплекси еквімолярного складу $[\text{PdHL}(\text{NH}_3)\text{Cl}]^{2-}$ ($\lg\beta=38.84(4)$), $[\text{PdHL}(\text{NH}_3)_2]^-$ ($\lg\beta=43.14(2)$), $[\text{PdL}(\text{NH}_3)_2]^{2-}$ ($\lg\beta=34.91(2)$), в яких молекула APrDP координована до центрального іона бідентатно атомами нітрогену аміногрупи та оксигену фосфонової групи. За двократного надлишку ліганду утворюються біслігандні комплекси $[\text{PdH}_4\text{L}_2]^{2-}$ ($\lg\beta=59.64(9)$), $[\text{PdH}_3\text{L}_2]^{3-}$ ($\lg\beta=57.39(19)$), $[\text{PdH}_2\text{L}_2]^{4-}$ ($\lg\beta=52.37(17)$), $[\text{PdHL}_2]^{5-}$ ($\lg\beta=44.71(9)$) $[\text{PdL}_2]^{6-}$ ($\lg\beta=36.57(6)$), в яких дві молекули APrDP координовані бідентатно. При $\text{pH}>7$ утворюються комплекси $[\text{PdHL}_2(\text{NH}_3)]^{5-}$ ($\lg\beta=48.57(6)$) та $[\text{PdL}_2(\text{NH}_3)_2]^{6-}$ ($\lg\beta=42.76(8)$), в яких координовані фосфонові групи молекул APrDP послідовно заміщуються при координації молекулами аміаку.

У системі $\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2\text{:APrDP}=1\text{:}1$ та $1\text{:}2$ утворюються комплекси тільки еквімолярного складу $[\text{Pd}(\text{en})(\text{H}_2\text{L})]$ ($\lg\beta=28.88(9)$), $[\text{Pd}(\text{en})(\text{HL})]^-$ ($\lg\beta=24.67(8)$), $[\text{Pd}(\text{en})\text{L}]^{2-}$ ($\lg\beta=16.84(9)$), до координаційної сфери яких входять атоми нітрогену аміногрупи та оксигену фосфонової групи APrDP та два атоми нітрогену аміногруп молекули етилендіаміну.

При співвідношенні $\text{Pd}(\text{II})\text{:APrDP}=2\text{:}1$ встановлено утворення біядерних комплексів $\{[\text{Pd}(\text{NH}_3)_2]_2\text{L}\}$ ($\lg\beta=63.58(22)$) та $\{[\text{Pd}(\text{en})]_2\text{L}\}$ ($\lg\beta=25.18(4)$), в яких два атоми паладію мають різне координаційне оточення.

Ключові слова: дифосфонові кислоти, цис-дихлородіамінпаладій(II), дихлоро(етилендіамін)паладій(II), константи утворення.

ВСТУП. Дослідження комплексоутворення металів платинової групи з лігандами, що мають доведену біологічну активність, спрямовані на вирішення однієї з фундаментальних проблем біонеорганічної хімії – створення фармакологічних препаратів із покращеними терапевтичними властивостями для лікування онкологічних захворювань. Актуальність цих досліджень зумовлена високою токсичністю та низькою специфічністю найбільш ефективного протипухлинного препарату **Цисплатин**, що обмежує можливості його застосування для лікування онкологічних захворювань. Перспективними для пошуку нових протипухлинних препаратів є сполуки паладію(II), які характеризуються високою протипухлинною активністю, меншою токсичністю порівняно зі сполуками платини(II) та відсутністю перехресної резистентності з платиновими препаратами [1–2].

На роль молекул лігандів запропоновано обрати 1-амінопропіліден-1,1-дифосфонову кислоту, яка містить поєднану безпосередньо з гемінальним вузлом аміногрупу в α -положенні. Дифосфонові та амінодифосфонові кислоти, які є синтетичними аналогами природних пірофосфатів, мають властивість зв'язуватися з мінеральним матриксом кістки, що можна використати для адресної доставки цитотоксичного металу до місця ураження кісткової тканини

безпосередньо раковою пухлиною або метастазами [3]. Отже, поєднання в складі комплексу цитотоксичного металу паладію з дифосфоновими кислотами, що проявляють антирезорбційну та антиметастатичну активність, може виявитися ефективним для розроблення малотоксичного протипухлинного препарату спрямованої дії.

У цій роботі наведено результати досліджень реакцій комплексоутворення цис-Pd(NH₃)₂Cl₂ та Pd(en)Cl₂ (en – етилендіамін) із 1-амінопропіліден-1,1-дифосфоновою кислотою (APrDP) у розчинах із зовнішньоклітинною концентрацією хлорид-іонів (0.15 моль/л) та співвідношенні Pd(II):APrDP=1:1, 1:2 та 2:1.

ЕКСПЕРИМЕНТ І ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ. У роботі використовували 1-амінопропіліден-1,1-дифосфонову кислоту, синтезовану за методикою, що аналогічна [4].

Синтез цис-Pd(NH₃)₂Cl₂ та Pd(en)Cl₂ проводили за схемами:

pH-потенціометричне титрування амінодифосфонові кислот проводили 0,1 моль/л розчином KOH, вільним від карбонатів, за

20.0 ± 0.1 °C. Концентрація кислоти у вихідних розчинах становила 0.001 та 0.005 моль/л, початковий об'єм – 20.0 мл. pH

розчинів вимірювали на рН-метрі 827 pH lab фірми Metrohm. Для калібрування рН-метра використовували стандартні буферні розчини з рН 1.68, 6.86 та 9.18. Крива титрування кислоти містили не менше 4 точок у широкій області рН при додаванні 4 еквівалентів КОН. Спектрофотометричне дослідження проводили для серії розчинів із співвідношенням метал: ліганд = 1:1 та 1:2 та 2:1 при концентраціях Pd(II) 0.001 моль/л та 0.002 моль/л. Всі досліджувані розчини мали постійну іонну силу ($I=0.15$ моль/л KCl). Електронні спектри поглинання (ЕСП) реєстрували на спектрофотометрі Specord-M40 у кварцевій кюветі ($l=1$ см). Спектри ЯМР (^{31}P -{H}) реєстрували на спектрометрі Bruker AVANCE 400 без стабілізації дейтерієм умов резонансу. Значення хімічних зсувів сигналів ядер фосфору в спектрах ЯМР ^{31}P визначали щодо зовнішнього стандарту (85% H_3PO_4). Вимірювання рН і запис ЕСП та спектрів ЯМР проводили через 24 години після приготування серії розчинів, що містять паладій (II) і амінодифосфонову кислоту.

Константи протонування амінодифосфонової кислот і константи утворення комплексів розраховано за програмою PSEQUAD [5] за даними рН-потенціометрії і спектрофотометрії двох паралельних серій за формулами:

$$\beta_{\text{HzL}} = [\text{H}_z\text{L}] / [\text{L}][\text{H}]^z, \quad (1)$$

$$\beta = [\text{M}_x\text{L}_y\text{H}_z\text{Cl}_q] / [\text{M}]^x[\text{L}]^y[\text{H}]^z[\text{Cl}]^q. \quad (2)$$

Склад внутрішньої координаційної сфери (хромофору) комплексів Pd(II) визначали за співставленням положення максимумів смуги поглинання в ЕСП (ν_{max} , cm^{-1}) із положення максимуму, розрахованого за формулою:

$$\nu_{\text{calc.}} = n_1 \nu(\text{Cl}) + n_2 \nu(\text{OH}_2\text{O}) + n_3 \nu(\text{N}_{\text{амін.}}) + n_4 \nu(\text{OPO}_3), \quad (3)$$

де n_i – кількість донорних атомів кожного типу; ν – величина інкременту для донорного атома кожного типу (cm^{-1}): $\nu(\text{Cl}) = 5170$, $\nu(\text{OH}_2\text{O}) = 6580$, $\nu(\text{N}_{\text{амін.}}) = 8460$ и $\nu(\text{OPO}_3) = 6831$ [6].

При використанні для дослідження комплексоутворення у ролі вихідних сполук цис- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ або $\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2$ слід враховувати всі можливі рівноваги реакцій акватації, гідролізу та конкурентних реакцій заміщення між лігандами (NH_3 та Cl^-), які залежать від концентрації в розчині вихідної сполуки Pd(II), хлорид-іонів, аміаку та рН. Склад та константи утворення комплексів Pd(II) з Cl^- , NH_3 та H_2O , які використовували для розрахунку констант утворення комплексів у досліджуваних системах, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1.

Константи утворення комплексів паладію(II) з Cl^- , NH_3 , en та H_2O

Склад комплексів	$\lg \beta$	Література
$[\text{Pd}(\text{NH}_3)\text{Cl}_3]^-$	18.08	[7]
$[\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$	23.8	[7]
$[\text{Pd}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}]^+$	28.6	[7]
$[\text{Pd}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$	32.8	[8]
$[\text{Pd}(\text{NH}_3)_3(\text{H}_2\text{O})]^{2+}$	26.0	[8]
$[\text{Pd}(\text{NH}_3)_2(\text{H}_2\text{O})_2]^{2+}$	18.5	[8]
$[\text{Pd}(\text{NH}_3)(\text{H}_2\text{O})_3]^{2+}$	9.6	[8]
$[\text{PdCl}_4]^{2-}$	11.5	[9]
$[\text{PdCl}_3(\text{H}_2\text{O})]^-$	10.2	[9]
$[\text{PdCl}_2(\text{H}_2\text{O})_2]$	7.74	[9]
$[\text{PdCl}(\text{H}_2\text{O})_3]^+$	4.47	[9]

Продовження таблиці 1

Склад комплексів	$\lg \beta$	Література
$[\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{ClH}_2\text{O}]^+$	21.39	[10]
$\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2$	5.24	[11]
$[\text{Pd}(\text{en})(\text{H}_2\text{O})\text{Cl}]^+$	3.18	[11]
$[\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}(\text{OH})]$	-3.75	[12]
$\{[\text{Pd}(\text{en})]_2(\text{OH})_2\}^{2+}$	-7.758	[12]
$[\text{Pd}(\text{en})(\text{H}_2\text{O})(\text{OH})]^+$	-6.68	[12]
$[\text{Pd}(\text{en})(\text{OH})_2]$	-14.523	[12]
NH_4^+	9.36	[8]

Амінодифосфонові кислота APrDP у розчині знаходиться у вигляді цвітер-іона з локалізацією позитивного заряду на атомі нітрогену протонованої аміногрупи, та від'ємного – на атомі оксигену депротонованої фосфонові групи. Розраховані за даними рН-потенціометричного титрування величини констант кислотної дисоціації APrDP становили: $\text{pK}_1=1.88$, $\text{pK}_2=5.37$,

$\text{pK}_3=9.36$ та $\text{pK}_4=11.89$. За послідовної дисоціації APrDP перші три константи ($\text{pK}_1 - \text{pK}_3$) відносять до відщеплення 3 протонів фосфонових груп, pK_4 відносять до депротонування аміногрупи.

Комплексоутворення цис- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ з APrDP

У розчинах вихідної сполуки цис- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ залежно від концентрації $\text{Pd}(\text{II})$, хлорид-іонів, аміаку та рН можуть утворюватися комплекси, що містять у координаційній сфері хлорид-іони, молекули аміаку, молекули води та гідроксогрупу (табл.1). За побудованою діаграмою розподілу рівноважних концентрацій комплексів $\text{Pd}(\text{II})$ в розчинах цис- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ в 0.15 моль/л KCl залежно від рН встановлено, що за цієї концентрації хлорид-іонів в області значень рН 2-3 утворюються комплекси $[\text{PdCl}_4]^{2-}$ та $[\text{PdCl}_3\text{H}_2\text{O}]^-$, при рН~5 – $[\text{Pd}(\text{NH}_3)\text{Cl}_3]^-$ і при рН<6.5 – $[\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$ (рис 1).

Рис. 1. Діаграма розподілу рівноважних концентрацій комплексів $\text{Pd}(\text{II})$ в розчині цис- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ ($C_{\text{Pd}(\text{II})}=0.002$ моль/л) в 0.15 моль/л KCl

Таким чином, при дослідженні комплексоутворення, виходячи з розчинів $\text{cis-Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ з фізіологічною концентрацією хлорид-іонів (0.15 моль/л KCl), слід враховувати, що в кислому середовищі у взаємодії будуть брати участь хлороаквакомплекс $\text{Pd}(\text{II})$ і координація дифосфонових кислот та молекул аміаку до центрального іона металу при підвищенні рН буде відбуватися із заміщенням хлорид-іонів та молекул води у координаційній сфері хлороаквакомплексів.

ВЕСП розчинів системи $\text{cis-Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$: APrDP = 1:1, 1:2 та 2:1 в 0.15 моль/л KCl при підвищенні рН від 3 до 9 спостерігали послідовний гіпсохромний зсув максимуму

смуги поглинання, який свідчив про утворення комплексів із координацією APrDP до $\text{Pd}(\text{II})$ та конкурентним входженням до координаційної сфери комплексів хлорид-іонів та молекул аміаку (рис. 2).

Визначення складу внутрішньої координаційної сфери комплексів проводили на основі положень смуг поглинання в ЕСП, величин хімічного зсуву та перерозподілом інтегральної інтенсивності сигналів ядер атомів фосфору в спектрах ЯМР ^{31}P (табл. 2).

За даними ЕСП та рН-потенціометрії системи $\text{cis-Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$: APrDP = 1:1, 1:2 та 2:1 у 0.15 моль/л KCl розраховано константи утворення комплексів $\text{Pd}(\text{II})$ (табл. 3).

Рис. 2. ЕСП системи $\text{cis-Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ - APrDP в 0.15 моль/л KCl . (а) $C_{\text{Pd}}=C_{\text{APrDP}}=2\cdot 10^{-3}$ моль/л, рН: 3.72 (1), 4.21 (2), 4.42 (3), 4.73 (4), 4.93 (5), 5.29 (6), 5.68 (7), 6.09 (8), 6.57 (9), 7.04 (10), 7.55 (11), 7.80 (12), 8.05 (13), 8.31 (14), 8.52 (15); (б) $C_{\text{Pd}}=2\cdot 10^{-3}$ моль/л, $C_{\text{APrDP}}=4\cdot 10^{-3}$ моль/л, рН: 3.11 (1), 3.68 (2), 4.0 (3), 4.32 (4), 4.62 (5), 5.33 (6), 6.37 (7), 7.25 (8), 7.43 (9), 7.86 (10), 8.45 (11), 8.54 (12), 8.84 (13), 9.00 (14), 9.26 (15), 9.30 (16), 9.53 (17); (в) $C_{\text{Pd}}=2\cdot 10^{-3}$ моль/л, $C_{\text{APrDP}}=1\cdot 10^{-3}$ моль/л, рН: 4.46 (1), 4.78 (2), 5.05 (3), 5.29 (4), 5.56 (5), 5.86 (6), 6.15 (7), 6.45 (8), 6.71 (9), 7.12 (10), 7.21 (11), 8.07 (12)

Рис. 2. ЕСП системи цис- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ -APrDP в 0.15 моль/л KCl. (а) $C_{\text{Pd}}=C_{\text{APrDP}}=2\cdot 10^{-3}$ моль/л, рН: 3.72 (1), 4.21 (2), 4.42 (3), 4.73 (4), 4.93 (5), 5.29 (6), 5.68 (7), 6.09 (8), 6.57 (9), 7.04 (10), 7.55 (11), 7.80 (12), 8.05 (13), 8.31 (14), 8.52 (15); (б) $C_{\text{Pd}}=2\cdot 10^{-3}$ моль/л, $C_{\text{APrDP}}=4\cdot 10^{-3}$ моль/л, рН: 3.11 (1), 3.68 (2), 4.0 (3), 4.32 (4), 4.62 (5), 5.33 (6), 6.37 (7), 7.25 (8), 7.43 (9), 7.86 (10), 8.45 (11), 8.54 (12), 8.84 (13), 9.00 (14), 9.26 (15), 9.30 (16), 9.53 (17); (в) $C_{\text{Pd}}=2\cdot 10^{-3}$ моль/л, $C_{\text{APrDP}}=1\cdot 10^{-3}$ моль/л, рН: 4.46 (1), 4.78 (2), 5.05 (3), 5.29 (4), 5.56 (5), 5.86 (6), 6.15 (7), 6.45 (8), 6.71 (9), 7.12 (10), 7.21 (11), 8.07 (12)

Таблиця 2.

Параметри ЯМР (^{31}P) системи цис- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2\text{-APrDP}$ у 0.15 моль/л KCl ($C_{\text{Pd}}=0.002$ моль/л)

pH	$\delta^{31}\text{P}$ (коорд. PO_3), м.ч	$\delta^{31}\text{P}$ (некоорд. PO_3), м.ч	$\delta^{31}\text{P}$ (PO_3 вільної APrDP), м.ч.
цис- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2\text{:APrDP}=1:1$			
2.39	37.5	14.7	13.6
3.73	37.2	14.7	13.6
4.59	37.8; 35.8	15.8; 15.0	
5.31	39.3; 35.2	15.5; 14.9	
5.70	39.1; 36.1	15.1; 14.3	
6.42	35.1	16.0;	
7.75	35.8; 35.1	16.7; 15.7	
8.47	36.3; 35.4	15.3	
цис- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2\text{:APrDP}=1:2$			
2.69	38.1	14.5	13.7
3.84	37.0	15.1	13.7
6.73	35.4	16.3	
8.05	35.0	15.7; 13.6	
8.48	35.1	15.3; 14.0	
8.78	35.4	15.1; 14.5	
8.80	35.5	15.1; 14.6	
9.02	35.5	15.0; 14.5	
9.34	35.7	16.0; 14.6	
цис- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2\text{:APrDP}=2:1$			
6.45	45.3; 36.7; 20.0	15.8	
7.83	45.3; 20		
8.29	45.3; 20.2		

Таблиця 3.

Константи утворення та склад хромофору комплексів, що утворюються в системі цис- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2\text{-APrDP}$

Склад комплексу	$\lg\beta$	Склад хромофору	$\nu_{\text{calc.}}, \text{cm}^{-1}$
$[\text{PdH}_2\text{LCl}_2]^{2-}$	36.98(4)	$[\text{Pd}; \text{Намін.}; \text{OPO}_3; 2\text{Cl}]$	25600
$[\text{PdHL}(\text{NH}_3)\text{Cl}]^{2-}$	38.84(4)	$[\text{Pd}; \text{Cl}; 2\text{Намін.}; \text{OPO}_3]$	28900
$[\text{PdHL}(\text{NH}_3)_2]^{-}$	43.14(2)	$[\text{Pd}; 3\text{Намін.}; \text{OPO}_3]$	32200
$[\text{PdL}(\text{NH}_3)_2]^{2-}$	34.91(2)	$[\text{Pd}; 3\text{Намін.}; \text{OPO}_3]$	32200

Продовження таблиці 3

$[\text{PdH}_4\text{L}_2]^{2-}$	59.94(9)	$[\text{Pd}; 2\text{Намін}; 2\text{ОРО}_3]$	30600
$[\text{PdH}_3\text{L}_2]^{3-}$	57.39(19)	$[\text{Pd}; 2\text{Намін}; 2\text{ОРО}_3]$	30600
$[\text{PdH}_2\text{L}_2]^{4-}$	52.37(17)	$[\text{Pd}; 2\text{Намін}; 2\text{ОРО}_3]$	30600
$[\text{PdHL}_2]^{5-}$	44.71(9)	$[\text{Pd}; 2\text{Намін}; 2\text{ОРО}_3]$	30600
$[\text{PdL}_2]^{6-}$	36.57(7)	$[\text{Pd}; 2\text{Намін}; 2\text{ОРО}_3]$	32200
$[\text{PdHL}_2(\text{NH}_3)]^{5-}$	48.57(6)	$[\text{Pd}; 3\text{Намін}; \text{ОРО}_3]$	32200
$[\text{PdL}_2(\text{NH}_3)_2]^{6-}$	42.76(8)	$[\text{Pd}; 4\text{Намін}]$	33800
$\{[\text{Pd}(\text{NH}_3)_2]\text{L}\}$	63.58(22)	$[\text{Pd}; 3\text{Намін}; \text{ОРО}_3]$	32200
		$[\text{Pd}; 2\text{Намін}; 2\text{ОРО}_3]$	30600

Наведений в таблиці 3 склад хромофорів комплексів та розраховані за інкрементами відповідні положення максимумів смуг поглинання узгоджуються зі змінами в ЕСП систем цис- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$:APrDP=1:1,

1:2 та 2:1 в 0.15 моль/л KCl та областями рН їхнього утворення згідно діаграм розподілу рівноважних концентрацій комплексів Pd(II) з APrDP (рис. 3).

Рис. 3. Діаграми розподілу рівноважних концентрацій комплексів Pd(II) в системі цис- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ -APrDP у 0.15 моль/л KCl. (а) $C_{\text{Pd}}=C_{\text{APrDP}}=2\cdot 10^{-3}$ моль/л; (б) $C_{\text{Pd}}=2\cdot 10^{-3}$ моль/л, $C_{\text{APrDP}}=4\cdot 10^{-3}$ моль/л; (в) $C_{\text{Pd}}=2\cdot 10^{-3}$ моль/л, $C_{\text{APrDP}}=1\cdot 10^{-3}$ моль/л

Рис. 3. Діаграми розподілу рівноважних концентрацій комплексів Pd(II) в системі цис- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ -APrDP у 0.15 моль/л KCl. (а) $C_{\text{Pd}}=C_{\text{APrDP}}=2\cdot 10^{-3}$ моль/л; (б) $C_{\text{Pd}}=2\cdot 10^{-3}$ моль/л, $C_{\text{APrDP}}=4\cdot 10^{-3}$ моль/л; (в) $C_{\text{Pd}}=2\cdot 10^{-3}$ моль/л, $C_{\text{APrDP}}=1\cdot 10^{-3}$ моль/л

Так, у системі цис- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$: $\text{APrDP} = 1:1$ смуга поглинання з $\nu_{\text{max}} = 25200 \text{ см}^{-1}$ при рН 3.72 відповідає комплексу $[\text{PdH}_2\text{LCl}_2]^{2-}$, який утворюється при бідентатній координації APrDP до хлороаквакомплексів $\text{Pd}(\text{II})$ атомами нітрогену аміногрупи та кисню фосфонової групи (рис. 2а, 3а). У спектрах ЯМР ^{31}P системи в області рН 2.39–4.59 при утворенні комплексу $[\text{PdH}_2\text{LCl}_2]^{2-}$ спостерігали сигнали ядер фосфору в складі координованих та незв'язаних із $\text{Pd}(\text{II})$ фосфонових груп ліганду з $\delta(^{31}\text{P}) \sim 37 \text{ м.ч}$ та $\sim 14 \text{ м.ч}$ відповідно та фосфонових груп вільної APrDP при 13, 6 м.ч. (табл. 2). Зсув максимуму смуги поглинання до 28600 см^{-1} при підвищенні рН до 5.29 зумовлено утворенням комплексу $[\text{PdHL}(\text{NH}_3)\text{Cl}]^{2-}$ при координації однієї молекули аміаку з витісненням хлорид-іона. В спектрі ЯМР ^{31}P при підвищенні рН до 5.70 послідовно фіксується поява та зростання інтегральної інтенсивності сигналів із $\delta(^{31}\text{P}) \sim 36 \text{ м.ч}$ та $\sim 15 \text{ м.ч}$, які можуть відповідати координованій та незв'язаній з $\text{Pd}(\text{II})$ фосфоновим групамлігандувкомплексі $[\text{PdHL}(\text{NH}_3)\text{Cl}]^{2-}$. Утворення комплексів $[\text{PdHL}(\text{NH}_3)_2]^{-}$ та $[\text{PdL}(\text{NH}_3)_2]^{2-}$ при координації другої молекули аміаку з витісненням хлорид-іону призводить до подальшого зсуву смуги поглинання до 30600 см^{-1} , який спостерігали в ЕСП розчинів системи при підвищенні рН від 6.05 до 8.52. За даними ЯМР ^{31}P , утворення комплексів $[\text{PdHL}(\text{NH}_3)_2]^{-}$ та $[\text{PdL}(\text{NH}_3)_2]^{2-}$ супроводжувалося появою близько розташованих сигналів в області координованих та незв'язаних із $\text{Pd}(\text{II})$ фосфонових груп ліганду комплексу $[\text{PdHL}(\text{NH}_3)\text{Cl}]^{2-}$ з подальшим перерозподілом їхніх інтегральних інтенсивнос-

тей, що може підтверджувати протікання рівноважних реакцій утворення комплексів $[\text{PdHL}(\text{NH}_3)_2]^{-}$ та $[\text{PdL}(\text{NH}_3)_2]^{2-}$ з іншим складом координаційної сфери (табл. 2).

$[\text{PdHL}(\text{NH}_3)\text{Cl}]^{2-}$

$[\text{PdHL}(\text{NH}_3)_2]^{-}$

$[\text{PdL}(\text{NH}_3)_2]^{2-}$

За даними ЕСП та рН-потенціометрії, системи зі співвідношенням цис-

$\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2:\text{APrDP}=1:2$ розраховані константи утворення комплексів біслігандного складу (рис. 26, табл. 2). Як видно з діаграми розподілу рівноважних концентрацій комплексів, за двократного надлишку ліганду при підвищенні рН від 2.0 до 7.0 у розчині утворюються комплекси $[\text{PdH}_2\text{LCl}_2]^{2-}$, $[\text{PdH}_4\text{L}_2]^{2-}$, $[\text{PdH}_3\text{L}_2]^{3-}$, $[\text{PdH}_2\text{L}_2]^{4-}$ та $[\text{PdHL}_2]^{5-}$, координаційна сфера яких сформована двома атомами нітрогену аміногруп та двома атомами оксигену фосфонових групи бідентатно координованих молекул APrDP (рис. 36). У ЕСП у цій області рН спостерігали зростання інтенсивності смуги з ν_{max} 29800 cm^{-1} , що відповідає комплексам із хромофором $[\text{Pd}; 2\text{N}_{\text{amin.}}; 2\text{OPO}_3]$. У спектрах ЯМР ^{31}P при рН від 2.93 до 6.73 ідентифікуються сигнали ядер атомів фосфору в складі координованих і незв'язаних із Pd(II) фосфонових груп APrDP у складі комплексу $[\text{PdH}_2\text{LCl}_2]^{2-}$ та біслігандних комплексів. При рН > 7 відбувається заміщення координованої фосфонової групи однієї молекули ліганду молекулою аміаку з утворенням комплексу $[\text{PdHL}_2(\text{NH}_3)]^{5-}$. Заміщення другої координованої фосфонової групи молекулою аміаку з утворенням комплексу $[\text{PdL}_2(\text{NH}_3)_2]^{6-}$ відбувається при рН > 8. Утворення комплексів із різним складом хромофору зумовлює поступовий зсув максимуму огинаючої смуги поглинання до 30200 cm^{-1} , появою плеча з максимумом ~ 32000 cm^{-1} та зростанням його інтенсивності. Утворення біслігандних комплексів, в яких одна або дві координовані фосфонові групи заміщуються молекулами аміаку, підтверджується зростанням інтегральної інтенсивності некоординованих фосфонових груп в області 16 м.ч – 14 м.ч.

$[\text{PdH}_4\text{L}_2]^{2-}$ $[\text{PdHL}_2\text{NH}_3]^{5-}$ $[\text{PdL}_2(\text{NH}_3)_2]^{6-}$

Як видно з рис. 4, інтегральні інтенсивності сигналів координованих і незв'язаних із Pd(II) фосфонових груп добре корелюють із концентраціями цих груп, розрахованих за діаграмою розподілу (рис. 36), що підтверджує адекватність запропонованій моделі комплексоутворення.

Рис. 4. Залежність концентрації координуваних і незв'язаних із Pd(II) фосфонових груп APrDP у біслігандних комплексах від pH (а) та (б) – концентрація незв'язаних із Pd(II) фосфонових груп за даними ЯМР ^{31}P та діаграми розподілу відповідно, (г) та (в) – концентрація координуваних фосфонових груп за даними ЯМР ^{31}P та діаграми розподілу відповідно.

При співвідношенні цис- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$: APrDP=2:1 в ЕСП цієї системи з підвищенням pH спостерігали смуги поглинання з максимумами при 25200 см^{-1} (pH=4.46) та 28600 см^{-1} (pH=6.15) (рис. 2 в). За подальшого зростання pH до 8.07 в ЕСП спостерігали широку смугу поглинання з максимумом $\sim 30200\text{ см}^{-1}$. За даними ЕСП та pH-потенціометрії, для системи цис- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$:APrDP=2:1 розраховано константи утворення комплексів еквімолярного складу $[\text{PdH}_2\text{LCl}_2]^{2-}$, $[\text{PdHL}(\text{NH}_3)\text{Cl}]^{2-}$ та біядерного комплексу $\{[\text{Pd}(\text{NH}_3)_2]_2\text{L}\}$ (табл. 3). Передбачається, що в біядерному комплексі два атоми паладію можуть мати різне координаційне оточення. До складу плоско-квадратної координаційної сфери одного з атомів паладію входять атом нітрогену аміногрупи та оксигену фосфоно-

вої групи ліганду та дві молекули аміаку. Другий атом паладію координує два атоми оксигену фосфонових груп ліганду та дві молекули аміаку. У спектрах ЯМР ^{31}P при pH=6.45 окрім сигналів ядер фосфору з δP 36.7 м.ч та 15.9 м.ч, які відповідають координуваним та незв'язаним фосфоновим групам у складі моноядерного комплексу, спостерігали появу двох сигналів з $\delta(^{31}\text{P})$ 45.3 м.ч та 20.0 м.ч. з однаковою інтегральною інтенсивністю, що може свідчити про утворення в розчинах системи цис- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$:APrDP=2:1 біядерного комплексу. При pH>7.83 в спектрах ЯМР ^{31}P присутні тільки сигнали, що відповідають згідно діаграми розподілу рівноважних концентрацій біядерному комплексу (рис. 3в). Наявність у спектрах ЯМР ^{31}P системи цис- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ -APrDP=2:1 при

$\text{pH} > 7.83$ двох сигналів з однаковою інтегральною інтенсивністю може свідчити про нееквівалентність хімічного оточення ядер фосфору координованих фосфонових груп APrDP у складі біядерного комплексу.

Комплексоутворення $\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2$ з APrDP

Зважаючи на діаграму розподілу рівноважних концентрацій комплексів $\text{Pd}(\text{II})$, які утворюються в розчинах $\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2$ в 0.15 моль/л KCl залежно від pH , слід відзначити, що в області pH 3–7 домінує комплекс $[\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}]$ (~ 95%), при підвищенні pH від 7 до 8 утворюється комплекс $[\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}(\text{OH})]$ і при $\text{pH} > 8$ – $[\text{Pd}(\text{en})(\text{OH})_2]$ (рис. 5).

В ЕСП системи $\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2:\text{AprDP}=1:1$ та 1:2 в 0.15 моль/л KCl в області pH 3–8 спостерігали зсув максимуму смуги поглинання від 26800 cm^{-1} до 32000 cm^{-1} , що свідчить про утворення комплексу з хромофором $[\text{Pd}; 3\text{N}_{\text{амін}}; \text{OPO}_3]$ при бідентатній координації AprDP до центрального іона металу атомами нітрогену аміногрупи та оксигену фосфонової групи (рис. 6а, 6б).

C Pd, %

Рис. 5. Діаграма розподілу рівноважних концентрацій комплексів $\text{Pd}(\text{II})$ в розчині $\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2$ ($C_{\text{Pd}(\text{II})}=0.001$ моль/л) у 0.15 моль/л KCl

Рис. 6. ЕСП розчинів системи $\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2$ -APrDP в 0.15 моль/л KCl. (а) $C_{\text{Pd}} = C_{\text{APrDP}} = 0.001$ моль/л, рН: 3.05 (1), 3.24 (2), 3.47 (3), 3.76 (4), 4.02 (5), 4.29 (6), 4.70 (7), 5.80 (8), 7.30 (9), 7.68 (10), 7.97 (11); (б) $C_{\text{Pd}} = 1 \cdot 10^{-3}$ моль/л, $C_{\text{APrDP}} = 2 \cdot 10^{-3}$ моль/л, рН: 2.78 (1), 3.03 (2), 3.49 (3), 4.01 (4), 4.79 (5), 6.99 (6), 7.77 (7), 8.23 (8), 8.69 (9); (в) $C_{\text{Pd}} = 1 \cdot 10^{-3}$ моль/л, $C_{\text{APrDP}} = 5 \cdot 10^{-4}$ моль/л, рН: 3.30 (1), 3.45 (2), 3.67 (3), 3.86 (4), 4.05 (5), 4.26 (6), 4.58 (7), 5.20 (8), 6.00 (9), 6.70 (10), 7.14 (11)

Рис. 6. ЕСП розчинів системи $\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2\text{-ApDP}$ в 0.15 моль/л KCl . (а) $C_{\text{Pd}}=C_{\text{ApDP}}=0.001$ моль/л, рН: 3.05 (1), 3.24 (2), 3.47 (3), 3.76 (4), 4.02 (5), 4.29 (6), 4.70 (7), 5.80 (8), 7.30 (9), 7.68 (10), 7.97 (11); (б) $C_{\text{Pd}}=1\cdot 10^{-3}$ моль/л, $C_{\text{ApDP}}=2\cdot 10^{-3}$ моль/л, рН: 2.78 (1), 3.03 (2), 3.49 (3), 4.01 (4), 4.79 (5), 6.99 (6), 7.77 (7), 8.23 (8), 8.69 (9); (в) $C_{\text{Pd}}=1\cdot 10^{-3}$ моль/л, $C_{\text{ApDP}}=5\cdot 10^{-4}$ моль/л, рН: 3.30 (1), 3.45 (2), 3.67 (3), 3.86 (4), 4.05 (5), 4.26 (6), 4.58 (7), 5.20 (8), 6.00 (9), 6.70 (10), 7.14 (11)

За даними ЕСП та рН-потенціометрії систем $\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2\text{:ApDP}=1:1$ та $1:2$, розраховано константи утворення комплексів $[\text{Pd}(\text{en})(\text{H}_2\text{L})]$, $[\text{Pd}(\text{en})(\text{HL})]^-$ та $[\text{Pd}(\text{en})(\text{L})]^{2-}$ (табл. 4) та побудовано діаграми розподілу рівноважних концентрацій комплексів $\text{Pd}(\text{II})$ (рис. 7).

Таблиця 4.

Константи утворення та склад хромофору комплексів, що утворюються в системі $\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2\text{-ApDP}$

Склад комплексу	$\lg\beta$	Склад хромофору	$\nu_{\text{calc.}}, \text{cm}^{-1}$
$[\text{Pd}(\text{en})(\text{H}_2\text{L})]$	28.88(9)	$[\text{Pd}; 3\text{N}_{\text{амін}}; \text{OPO}_3]$	32000
$[\text{Pd}(\text{en})(\text{HL})]^-$	24.67(8)	$[\text{Pd}; 3\text{N}_{\text{амін}}; \text{OPO}_3]$	32000
$[\text{Pd}(\text{en})\text{L}]^{2-}$	16.84(9)	$[\text{Pd}; 3\text{N}_{\text{амін}}; \text{OPO}_3]$	32000
$\{[\text{Pd}(\text{en})]_2\text{L}\}$	25.18(4)	$[\text{Pd}; 3\text{N}_{\text{амін}}; \text{OPO}_3]$	32000
		$[\text{Pd}; 2\text{N}_{\text{амін}}; \text{OPO}_3]$	30600

Рис. 7. Діаграми розподілу рівноважних концентрацій комплексів Pd(II) в системі $\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2$ -A_{PrDP} у 0.15 моль/л KCl. (а) $C_{\text{Pd}} = C_{\text{A_{PrDP моль/л; (б) $C_{\text{Pd}} = 1 \cdot 10^{-3}$ моль/л, $C_{\text{A_{PrDP моль/л}$}$

Згідно діаграми (рис. 7а), в системі $[\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2]:\text{APrDP}=1:1$ при $\text{pH}>4$ утворюється комплекс $[\text{Pd}(\text{en})(\text{HL})]^-$ та при $\text{pH}>7$ – $[\text{Pd}(\text{en})\text{L}]^{2-}$.

У спектрах ЯМР ^{31}P системи $\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2:\text{APrDP}=1:1$ та $1:2$ спостерігали сигнала-

ли ядер атомів фосфору фосфонових груп вільної APrDP з $\delta(^{31}\text{P}) \sim 13.2$ м.ч., фосфонових груп APrDP координованих із $\delta(^{31}\text{P}) \sim 35.4$ м.ч. та некоординованої до центрального іона металу з $\delta(^{31}\text{P}) \sim 16.4$ м.ч (табл. 5).

Таблиця 5.

Параметри ЯМР (^{31}P) системи $\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2 - \text{APrDP}$ 0.15 моль/л KCl ($C_{\text{Pd}} = 0.002$ моль/л)

pH	$\delta(^{31}\text{P})$ (коорд. PO_3), м.ч	$\delta(^{31}\text{P})$ (некоорд. PO_3), м.ч	$\delta(^{31}\text{P})$ (PO_3 вільної APrDP), м.ч.
$\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2:\text{APrDP}=1:1$			
5.30	35.3	16.4	
$\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2:\text{APrDP}=1:2$			
5.60	35.4	16.5	13.2
$\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2:\text{APrDP}=2:1$			
7.32	44.4; 38.3; 20.3	16.5	

Співвідношення інтегральних інтенсивностей сигналів з $\delta(^{31}\text{P}) \sim 13.2$ м.ч., 35.4 м.ч. та 16.4 м.ч, яке дорівнювало 2:1:1 у випадку системи $[\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2]-\text{APrDP}=1:2$ при pH 5.60, свідчить про утворення комплексу еквівалентного складу за двократного надлишку APrDP .

В ЕСП системи $[\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2]:\text{APrDP}=2:1$ в області pH 6.00–7.14 спостерігали широку смугу поглинання з максимумом $\sim 31600 \text{ см}^{-1}$ та плечем $\sim 32000 \text{ см}^{-1}$ (рис. 6в). Спектр ЯМР ^{31}P цієї системи при pH 7.32 містить чотири сигнали ядер атомів фосфору. Сигнали з $\delta(^{31}\text{P})$ 38.3 м.ч. та 16.5 м.ч можуть відповідати координованим та незв'язаним із $\text{Pd}(\text{II})$ фосфоновим групам APrDP відповідно до комплексу еквімолярного складу, з $\delta(^{31}\text{P})$ 44.4 м.ч. та 20.3 м.ч. – двом у різний спосіб координованим фосфоновим групам у складі біядерного комплексу. Слід відмітити, що хімічні зсуви сигналів ядер атомів фосфору в спектрах ЯМР, які можуть відповідати

двом у різний спосіб координованим фосфоновим групам APrDP у складі біядерних комплексів $\{[\text{Pd}(\text{NH}_3)_2]_2\text{L}\}$ та $\{[\text{Pd}(\text{en})]_2\text{L}\}$, мають близькі значення:

ВИСНОВОК. Результати дослідження комплексоутворення цис- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ та $[\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2]$ з 1-амінопропілен-1,1-дифосфоновією кислотою показали, що залежно від складу вихідної сполуки $\text{Pd}(\text{II})$ співвідношення концентрації $\text{Pd}(\text{II})$ до APrDP та pH , в розчинах утворюються комплекси еквімолярного, біслігандного та біядерного складу.

В комплексах еквівалентного складу APrDP координована до Pd(II) бідентатно атомами нітрогену аміногрупи та кисню фосфонові групи. Координаційна сфера комплексів еквімолярного складу, що утворюються в системі цис- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$:APrDP=1:1, залежно від pH доповнена хлорид-іонами або молекулами аміаку, а в системі $[\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2]$:APrDP=1:1 – двома атомами нітрогену координованої молекули етилендіаміну.

У біслігандних комплексах, які утворюються в системі цис- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$:APrDP=1:2 в області pH 2.0–6.5, координаційна сфера сформована двома бідентатно координованими молекулами APrDP. При pH>7 відбувається послідовна координація двох молекул аміаку із заміщенням двох фосфонових груп. У біядерних комплексах $\{[\text{Pd}(\text{NH}_3)_2]_2\text{L}\}$ та $\{[\text{Pd}(\text{en})]_2\text{L}\}$, які утворюються при співвідношенні метал:ліганд=2:1, два атоми паладію можуть мати різне координаційне оточення. До складу пласко-квадратної координаційної сфери одного з атомів паладію входять атом нітрогену аміногрупи та кисню фосфонові групи APrDP та дві молекули аміаку. Другий атом паладію координує два атоми кисню двох фосфонових груп APrDP та дві молекули аміаку або дві аміногрупи молекули етилендіаміну.

Роботу виконано в рамках проекту № держреєстрації 0120U102323 цільової програми фундаментальних досліджень НАН України «Перспективні фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і нанотехнологій для потреб промисловості, охорони здоров'я та сільського господарства» на 2020–2024 рр.

COMPLEXATION OF CIS- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ AND $\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2$ WITH 1-AMINOPROPYLIDENE-DIPHOSPHONIC ACID.

O.M. Kozachkova^a, N.V. Tsaryk^a,
V.I. Pekhnyo^a, V.V. Trachevskyi^b

^aVernadsky Institute of general and inorganic chemistry of the Ukrainian National Academy of Sciences, 32/34, Akad. Palladin av., 03142, Kyiv, Ukraine.

^bTechnical centre of NAS of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine, 13, Pokrovs'ka St., 04079, Kyiv, Ukraine.

The complexation of cis- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ and $\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2$ (en – ethylenediamine) with 1-aminopropylidene-1,1-diphosphonic acid (APrDP, H_4L) in solutions with extracellular concentration of chloride ions (0.15 mol/L) at the ratios Pd(II):APrDP=1:1, 1:2 and 2:1 has been studied by pH-potentiometry, electron and NMR spectroscopy.

It has been found that upon interaction in the system cis- $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$:APrDP=1:1, complexes of the equimolar composition $[\text{PdHL}(\text{NH}_3)\text{Cl}]^{2-}$ ($\lg\beta=38.84(4)$), $[\text{PdHL}(\text{NH}_3)_2]^-$ ($\lg\beta=43.14(2)$) and $[\text{PdL}(\text{NH}_3)_2]^{2-}$ ($\lg\beta=34.91(2)$) are formed depending on pH, in which the APrDP molecule is coordinated in a bidentate fashion to the central ion by the nitrogen atom of the amine group and oxygen atom of the phosphonic group. In the case of twofold excess of ligand, bisligand complexes $[\text{PdH}_4\text{L}_2]^{2-}$ ($\lg\beta=59.64(9)$), $[\text{PdH}_3\text{L}_2]^{3-}$ ($\lg\beta=57.39(19)$), $[\text{PdH}_2\text{L}_2]^{4-}$ ($\lg\beta=52.37(17)$), $[\text{PdHL}_2]^{5-}$ ($\lg\beta=44.71(9)$) $[\text{PdL}_2]^{6-}$ ($\lg\beta=36.57(6)$) are formed, in which two APrDP molecules are coordinated in a bidentated fashion. At pH>7, complexes $[\text{PdHL}_2(\text{NH}_3)]^{5-}$ ($\lg\beta=48.57(6)$) and

$[\text{PdL}_2(\text{NH}_3)_2]^{6-}$ ($\lg\beta=42.76(8)$) are formed, in which the coordinated phosphonic groups of APrDP are sequentially replaced upon coordination by NH_3 molecules.

In the systems $\text{Pd}(\text{en})\text{Cl}_2:\text{APrDP}=1:1$ and $1:2$, complexes only of equimolar composition: $[\text{Pd}(\text{en})(\text{H}_2\text{L})]$ ($\lg\beta=28.88(9)$), $[\text{Pd}(\text{en})(\text{HL})]^-$ ($\lg\beta=24.67(8)$) and $[\text{Pd}(\text{en})\text{L}]^{2-}$ ($\lg\beta=16.84(9)$) are formed, whose coordination sphere contains the nitrogen atom of the amine group and oxygen atom of the phosphonic group of APrDP and two nitrogen atoms of the amine groups of an ethylenediamine.

At the ratio $\text{Pd}(\text{II}):\text{APrDP}=2:1$, the formation of binuclear complexes $\{[\text{Pd}(\text{NH}_3)_2]_2\text{L}\}$ ($\lg\beta=63.58(22)$) and $\{[\text{Pd}(\text{en})]_2\text{L}\}$ ($\lg\beta=25.18(4)$), in which two palladium atoms have a different coordination environment. The coordination sphere of one of the palladium contains a nitrogen atom of the amine group and an oxygen atom of the phosphonic group of APrDP, and two NH_3 molecules or two amine groups of ethylenediamine. The other palladium coordinates two oxygen atoms of phosphonic groups of APrDP and two NH_3 molecules or two amine groups of ethylenediamine.

Keywords: diphosphonic acid, dichlorodiamminepalladium(II), dichloro(ethylenediamine)palladium(II), formation constants.

ЛІТЕРАТУРА

- Carneiro T. J., Martins A.S., Marques M.P.M., Gil A.M. Metabolic Aspects of Palladium(II) Potential Anti-Cancer Drugs. *Front. Onkol.* 2020.
<https://doi.org/10.3389/fonc.2020.590970>
- Vojtek M., Marques P.M.P., Ferreira I., Mota-Filipe H., Diniz C. Anticancer activity of palladium-based complexes against triple-negative breast cancer. *Drug Discovery Today*, 2019. **24**. pp. 1044–1058.
DOI: 10.1016/j.drudis.2019.02.012
- Zhang S., Gangal G., Uludag H. “Magic bullets” for bone diseases: progress in rational design of bone-seeking medicinal agents. *Chem. Soc. Rev.* 2007. **36**: pp. 507–531.
- Dudko A.V., Bon V.V., Kozachkova A.N., Tsaryk N.V., Pekhnyo V.I. Synthesis and structure of 1-aminoethylidene diphosphonic acid. *Ukrainian Chemistry Journal*, 2008. **72**(10). pp. 104–108 [in Russian].
- Zekany L., Nagypal I. *Computational Methods for the Determination of Formation Constants*. New York: Plenum Press, 1985.
doi:10.1007/978-1-4684-4934-10-8.
- Kozachkova A.N., Tsaryk N.V., Pekhnyo V.I. Interaction of $\text{cis-Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ with diphosphonic acids in solutions at physiological chloride-ions concentration. *Ukrainian Chemistry Journal*, 2019. **85**(11). pp. 3–14 [in Russian].
<https://doi.org/10.33609/0041-6045.85.11.2019.3-14>
- Reinhardt R.A., Brenner N.L., Sparkes R.K. Equilibria among the chloroammine complexes of palladium(II). *Inorg. Chem.*, 1962. **6**(2). pp. 254–257.
- Rasmussen L. Palladium(II) Complexes. I. Spectra and Formation Constants of Ammonia and Ethylenediamine Complexes. *Acta Chem. Scand.* 1968. **22**. pp. 2313–2323.
- Smith R.M., Martell A.E. Critical stability constants. V 4. *Inorganic complexes*/ New York: Plenum Press, 1976. P. 104.
- Reinhardt R.A. The solubility of $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ in Electrolyte Solutions. *Inorg. Chem.*, 1962. **1**(4). pp. 839–842.
- Tercero-Moreno J.M., Matilla-Hernández A., González-García S., Niclós-Gutiérrez J. Hydrolytic species of the ion $\text{cis-diaqua(ethylenediamine)palladium(II)}$ complex and of

- cis-dichloro(ethylenediamine)palladium(II): fitting its equilibrium models in aqueous media with or without chloride ion. *Inorganica Chim. Acta*, 1996. **253**. pp. 23–29. [https://doi.org/10.1016/S0020-1693\(96\)05105-5](https://doi.org/10.1016/S0020-1693(96)05105-5)
12. Tercero J.M., Matilla A., Sanjuán M.A., Moreno C.F., Martín J.D., Walmsley J.A. Synthesis, characterization, solution equilibria and DNA binding of some mixed-ligand palladium(II) complexes. Thermodynamic models for carboplatin drug and analogous compounds. *Inorganica Chim. Acta*, 2003. **342**. pp. 77–87. [https://doi.org/10.1016/S0020-1693\(02\)01071-X](https://doi.org/10.1016/S0020-1693(02)01071-X)
- ### REFERENCES
1. Carneiro T. J., Martins A.S., Marques M.P.M., Gil A.M. Metabolic Aspects of Palladium(II) Potential Anti-Cancer Drugs. *Front. Onkol.* 2020. <https://doi.org/10.3389/fonc.2020.590970>
 2. Vojtek M., Marques P.M.P., Ferreira I., Mota-Filipe H., Diniz C. Anticancer activity of palladium-based complexes against triple-negative breast cancer. *Drug Discovery Today*. 2019. 24: 1044–1058. DOI: 10.1016/j.drudis.2019.02.012
 3. Zhang S., Gangal G., Uludag H. “Magic bullets” for bone diseases: progress in rational design of bone-seeking medicinal agents. *Chem. Soc. Rev.* 2007. **36**: 507–531.
 4. Dudko A.V., Bon V.V., Kozachkova A.N., Tsaryk N.V., Pekhnyo V.I. Synthesis and structure of 1-aminoethylidene diphosphonic acid. *Ukrainian Chemistry Journal*. 2008. **72**(10): 104–108 [in Russian].
 5. Zekany L., Nagypal I. *Computational Methods for the Determination of Formation Constants*. New York: Plenum Press. 1985. doi:10.1007/978-1-4684-4934-10-8
 6. Kozachkova A.N., Tsaryk N.V., Pekhnyo V.I. Interaction of cis-Pd(NH₃)₂Cl₂ with diphosphonic acids in solutions at physiological chloride-ions concentration. *Ukrainian Chemistry Journal*. 2019. 85(11): 3–14 [in Russian]. <https://doi.org/10.33609/0041-6045.85.11.2019.3-14>
 7. Reinhardt R.A., Brenner N.L., Sparkes R.K. Equilibria among the chloroammine complexes of palladium(II). *Inorg. Chem.* 1962. **6**(2): 254–257.
 8. Rasmussen L. Palladium(II) Complexes. I. Spectra and Formation Constants of Ammonia and Ethylenediamine Complexes. *Acta Chem. Scand.* 1968. **22**: 2313–2323.
 9. Smith R.M., Martell A.E. Critical stability constants. V 4. *Inorganic complexes*. New York: Plenum Press. 1976. 104.
 10. Reinhardt R.A. The solubility of Pd(NH₃)₂Cl₂ in Electrolyte Solutions. *Inorg. Chem.* 1962. **1**(4): 839–842.
 11. Tercero-Moreno J.M., Matilla-Hernández A., González-García S., Nicolás-Gutiérrez J. Hydrolytic species of the ion cis-diaqua(ethylenediamine)palladium(II) complex and of cis-dichloro(ethylenediamine)palladium(II): fitting its equilibrium models in aqueous media with or without chloride ion. *Inorganica Chim. Acta*. 1996. **253**: 23–29. [https://doi.org/10.1016/S0020-1693\(96\)05105-5](https://doi.org/10.1016/S0020-1693(96)05105-5)
 12. Tercero J.M., Matilla A., Sanjuán M.A., Moreno C.F., Martín J.D., Walmsley J.A. Synthesis, characterization, solution equilibria and DNA binding of some mixed-ligand palladium(II) complexes. Thermodynamic models for carboplatin drug and analogous compounds. *Inorganica Chim. Acta*. 2003. **342**: 77–87. [https://doi.org/10.1016/S0020-1693\(02\)01071-X](https://doi.org/10.1016/S0020-1693(02)01071-X)

Стаття надійшла 21.01.2022.